

به نام خدا

باشگاه دانش پژوهان جوان

امتحان نهایی دوره تابستانه

۱۰ شهریورماه ۱۳۸۷

مدت امتحان: ۳ ساعت

(۱) ستاره‌ی HD 209458 کی از اولین ستاره‌هایی بود که مسیاره‌ی آن به روش فتومنتری کشف شد. مشاهده‌های انجام شده بر روی این ستاره به وسیله‌ی یک تلسکوپ کوچک "۱۴" منجر به منحنی نوری شکل (۱) شده است که در آن محور افقی، زمان بر حسب ساعت و محور عمودی، قدر مشاهده شده است.

فرض کنید مدار سیاره دایره است. به این ترتیب می‌توان گذر سیاره را به شکل ساده به صورتی که در شکل (۲) آمده نشان داد.

در این شکل،  $a$  پارامتر برخورد (پارامتر برخورد یک کمیت بی‌بعد است)،  $R$  شعاع ستاره،  $\alpha$  شعاع مدار سیاره و  $\theta$  زاویه‌ی تعایل مداری سیاره است.

کل زمان گذر را به طور تقریبی می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$d \approx \frac{\ell R}{\pi a} \sqrt{(1 + \frac{r}{R})^2 - (\frac{a}{R} \cos \theta)^2}$$

که در آن  $r$  شعاع سیاره و  $P$  دوره‌ی تناوب حرکت آن است. هم‌چنین مدت زمان ورود و خروج سیاره (مدت زمانی که طول می‌کشد تا سیاره از بید ناظر به طور کامل وارد قرص ستاره شود، یا از آن خارج شود) از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$t = d \frac{r}{R} \sqrt{1 - b^2}$$

فرض کنید با استفاده از مشاهده‌های دیگری داریم  $R_{HD} = ۰/۹۱ R_{\odot}$  و  $M_{HD} = ۰/۹۲ M_{\odot}$ . با استفاده از داده‌های منحنی:


الف) کل مدت زمان گذر سیاره از روی ستاره را تخمین بزنید.

ب) شعاع مدار سیاره را حساب کنید.


پ) زاویه‌ی تعایل مداری سیاره را حساب کنید.

ت) دوره‌ی تناوب حرکت سیاره را حساب کنید.

ث) شعاع سیاره را حساب کنید.



## شکل ۱



شکل ۲

(۲) یک هواپیما در نقطه‌ای به طول جغرافیایی  $40^{\circ}$  غربی و عرض جغرافیایی  $10^{\circ}$  جنوبی به پرواز در می‌آید و قرار است که از فراز شهر A با طول جغرافیایی  $70^{\circ}$  شرقی و عرض جغرافیایی  $30^{\circ}$  شمالی بگذرد. اگر سرعت این هواپیما  $60 \text{ km/h}$  باشد و در ارتفاع  $7 \text{ km}$  از سطح زمین پرواز کند، از زمان شروع پرواز چه قدر می‌گذرد تا هواپیما به بیشترین عرض جغرافیایی ممکن برسد؟ این عرض جغرافیایی بیشینه چه قدر است؟

در زمان عبور از فراز شهر، امتداد حرکت هواپیما نا سمت شمال جغرافیایی چه زاویه‌ای می‌سازد؟ به صورت نظری این هواپیما چه مدت می‌تواند برای ناظری در شهر A قابل مشاهده باشد؟ از جذب و پراکندگی نور در جو زمین صرف نظر کنید و زمین را کروی و بدون عوارض سطحی در نظر بگیرید.

(۳) کوتوله‌ی سفید ستاره‌ای است که جرم آن از مرتبه‌ی جرم خورشید، و شعاع آن از مرتبه‌ی شعاع زمین است. منبع انرژی کوتوله‌های سفید انقباض گرانشی است. انرژی که یک کوتوله‌ی سفید می‌گسیلد،  $S = T^4$  است، که  $T$  دمای سطح کوتوله،  $S$  مساحت سطح کوتوله، و  $t$  ثابت استفان – بولتزمن است. جرم کوتوله را  $M$ ، شعاع آن را  $R$ ، و ثابت گرانش را با  $G$  نشان می‌دهیم. (الف) انرژی گرانشی کوتوله را تا حد یک ثابت بی‌بعد بر حسب  $M$  و  $R$  و  $G$  بنویسید. (لازم نیست این ثابت را حساب کنید، و در بخش‌های بعد هم می‌توانید آن را به کار ببرید.)  
 ب) توان گسیل شده از کوتوله را بر حسب  $M$ ،  $R$ ،  $t$  و ثابت‌ها بنویسید.  $t$  زمان است.  
 پ)  $(R/t)$  را بر حسب  $M$ ،  $R$ ،  $t$  و ثابت‌ها بنویسید.

(۴) جدول زیر داده‌های ۷ سیاره از ۸ سیاره‌ی یک منظومه است. به عبارت دیگر، داده‌های مربوط به یکی از سیاره‌ها در جدول نیامده‌است.

		دوره‌ی تناوب (بر حسب سال)	نیم قطر بزرگ (بر حسب AU)	خروج از مرکز	جرم (بر حسب $M_{\oplus}$ )
۱	۱,۱۰	۱,۶۳	۰,۲۱۵	۰,۱۶۵	
۲	۱,۹۰	۳,۷۰	۰,۰۲۷	۰,۸۱۰	
۳	۳,۵۰	۹,۲۶	۰,۰۱۷	۱,۵۰۰	
۴	۶,۷۰	۲۴,۰۳	۰,۰۹۵	۰,۲۰۷	
۵	۲۵,۸۰	۱۸۵,۳۳	۰,۰۵۰	۴۱۹,۰۰	
۶	۵۱,۵۰	۵۲۲,۶۷	۰,۰۷۷	۹۰,۲۰	
۷	۱۰۲,۷۰	۱۴۷۱,۸۷	۰,۰۶۵	۱۴,۵۰	

(الف) یک رابطه برای محاسبه‌ی اندازه‌ی نیم قطر بزرگ مدار سیاره‌ها در این سیستم به دست آورید به طوری که اگر  $n$  شماره‌ی سیاره باشد،  $a_n$  طول نیم قطر بزرگ آن باشد.

(ب) داده‌های مربوط به کدام سیاره در جدول نیامده‌است؟ اندازه‌ی نیم قطر بزرگ و دوره‌ی تناوب حرکت آن چه قدر است؟

(پ) جرم ستاره‌ی مرکزی این منظومه چه قدر است؟

(۵) در روزهای مختلف سال، طول روز تغییر می‌کند. اما خورشید در بلندترین روز سال، زودتر از بقیه‌ی روزها طلوع نمی‌کند ا برای ناظری در عرض جغرافیایی  $\lambda$  حساب کنید در چه روزی از سال، خورشید از همه‌ی روزها زودتر طلوع می‌کند؟ (مدار زمین را دایره فرض کنید).

در این روز مدت زمان به طول انجامیدن شفق را محاسبه کنید.

در تهران در چه روزی از سال خورشید از همه‌ی روزهای دیگر زودتر طلوع می‌کند؟ (عرض جغرافیایی تهران  $36^{\circ}$  شمالی است).