

به نام خدای مهریان  
باشگاه دانش پژوهان جوان  
امتحان جامع سوم  
۱۳۸۷ شهریور ماه  
مدت امتحان ۲ ساعت

(۱) می خواهیم با استفاده از دو عکس از یک کهکشان در دو زمان مختلف، سرعت کهکشان را حساب کنیم. نقطه‌ی مشاهده را مبدأ می‌گیریم. عکس‌های اول و دوم، کهکشان را به ترتیب در نقطه‌های  $r_1$  و  $r_2$  نشان می‌دهند. زمان گسیل نور برای این عکس‌ها به ترتیب  $t_1$  و  $t_2$  و زمان رسیدن نور این عکس‌ها به مبدأ به ترتیب  $t'_1$  و  $t'_2$  است. سرعت نور  $c$  است. بردار سرعت کهکشان را با  $v$  نشان می‌دهیم. مولفه‌ی این سرعت در راستای شعاعی و در جهت دورشدن از مبدأ، و  $v_\perp$  اندازه‌ی مولفه‌ی عمود بر شعاع این سرعت است. اندازه‌ی بردارهای  $r_1$  و  $r_2$  را بدتریب با  $r_1$  و  $r_2$  نشان می‌دهیم. در کل مسئله فرض کنید  $(t_2 - t_1)$  کوچک است و از جمله‌های درجه‌ی دو و بیشتر نسبت به  $(t_2 - t_1)$  چشم پیو شید.

الف)  $t'_1$  را بر حسب  $r_1$  و  $t_1$  و  $c$  به دست آورید.

ب)  $(r_1 - r_2)$  را بر حسب سرعت‌ها و  $(t_2 - t_1)$  به دست آورید.

پ)  $(t'_1 - t'_2)$  را بر حسب  $(t_2 - t_1)$  به دست آورید.

مولفه‌ی عمودی سرعت مشاهده شده را جایه‌جایی عمود بر شعاع تقسیم بر  $(t'_1 - t'_2)$  تعریف می‌کیم. این کمیت را با  $v_\perp$  نشان می‌دهیم. طول موج نوری که دریافت می‌شود تقسیم بر طول موج گسیلیده را با  $Z$  نشان می‌دهیم. می‌دانیم

$$Z = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} \left( 1 + \frac{v_\parallel}{c} \right)$$

ت)  $v_\perp$  را بر حسب سرعت‌ها به دست آورید.

ث) در یک آزمایش  $(v_\perp/c) = \tilde{\beta}_\perp$  و  $Z$  را سنجیده‌اند.  $(v_\parallel/c) = \beta_\parallel$  و  $(v_\parallel/c) = \beta_\parallel$  را بر حسب این دو کمیت حساب کنید.

(۲) مسیر نور هنگام عبور از کنار یک جرم گرانشی، اندکی تغییر می‌کند و از خط راست منحرف می‌شود (دچار خمیدگی می‌شود). اگر چه محاسبه‌ی مقدار این انحراف بر اساس مکانیک نسبیتی انجام می‌شود، در اینجا می خواهیم سعی کنیم بر اساس مکانیک نیوتونی، مقدار این انحراف را حساب کنیم. برای این کار کافی است رفتار نور را مانند یک ذره که تحت تاثیر یک جرم گرانشی قرار می‌گیرد، بررسی کنیم. مقدار انحراف پرتوهای نور یک ستاره‌ی دور دست که از لبه‌ی خورشید می‌گذرند را به این روش حساب کنید. (راهنماهی: مسیر نور منحرف شده به وسیله‌ی جرم گرانشی، هذلولی است).

(۳) یک منظومه‌ی دوتایی در نظر بگیرید که مولفه‌های آن روی مدار دایروی به گرد مرکز جرم منظومه در حرکتند. شعاع مدار، سرعت و جرم ستاره‌ی  $i$  به ترتیب  $r_i$ ،  $v_i$  و  $m_i$  و دوره‌ی تنابع منظومه است. راستای عمود بر صفحه‌ی مدار این منظومه با امتداد خط دید (خطی که مرکز جرم منظومه را به نقطه‌ی مشاهده وصل می‌کند)، زاویه‌ی  $\alpha$  می‌سازد. تفاضل بیشینه و کمینه‌ی  $\alpha$  برای مولفه‌های  $1$  و  $2$  به ترتیب  $\delta_1$  و  $\delta_2$  است که در آن  $\eta$  بسامد نور دریافتی (توسط ناظر) و  $\eta$  بسامد نور گسیل شده از این منظومه‌ی دوتایی است. کمیت‌های  $r_1$ ،  $r_2$ ،  $m_1$  و  $m_2$  را بر حسب  $\delta_1$ ،  $\delta_2$  و  $\alpha$  حساب کنید.


(۴) سه نموداری که در صفحه‌ی بعد آمده، نمودار HR سه خوشی ستاره‌ای M67، Tucanae و Hyades است. با توجه به شکل:

الف) خوشها را بر حسب سن شان مرتب کنید. پاسخ خود را توضیح دهید. (به پاسخ‌های بدون استدلال، امتیازی تعلق نمی‌گیرد).


ب) جدول زیر شامل داده‌هایی در مورد شاخص رنگی،  $B - V$ ، و دمای موثر،  $T_e$ ، ستاره‌های رشته‌ی اصلی است.

$B - V$	$T_e$
-0,27	25700
-0,25	24500
-0,23	21000
-0,20	17700
-0,15	14000
-0,10	11800
-0,05	10500
0,00	9480
0,10	8030
0,20	7910
0,30	7450
0,40	6800
0,50	6310
0,60	5910
0,70	5540
0,80	5230
0,90	5090
1,00	4840
1,20	4250


با فرض این‌که ستاره‌های هر یک از این خوشها در یک زمان متولد شده باشند، سن هر یک از خوشها را تخمین بزنید. (برای خورشید  $B - V = 0,64$  و مدت زمانی که خورشید در رشته‌ی اصلی می‌ماند،  $10^{10}$  سال است.)



M67 خوشه‌ی



47 Tucanae خوشه‌ی



Hyades خوشه‌ی